

СНИФФИНГ

процесс вдыхания газа из баллончиков
для заправки зажигалок или самих зажигалок

Чаще всего
такой формой
токсикомании
страдают
подростки
11 - 15 лет

Основные признаки опьянения газом:

- верхняя часть тела, голова обычно горячие
- на ощупь, лицо отёчное;
- раздражение слизистых верхних дыхательных путей;
- вокруг губ, особенно в уголках рта, отмечается кайма раздражения кожи;
- охриплость голоса;
- слабость, тошнота и рвота;
- грубые расстройства поведения.

Если вы заметили, что у вашего ребёнка появились вышеперечисленные признаки,
не затягивайте, обращайтесь в детскую поликлинику!

ЧТО ТАКОЕ СНИФФИНГ?

Сниффинг (от англ. to sniff – нюхать) – форма токсикомании, при которой состояние токсического опьянения достигается в результате вдыхания углеводородных сжиженных газов (бутан, изобутан, пропан), входящих в состав ряда товаров хозяйственно-бытового назначения (баллончики для заправки зажигалок или сами зажигалки, баллончики для работы портативных туристских газовых плит и др.).

Иногда к sniffingu относят и другие виды токсикомании – вдыхание различных аэрозолей бытовой химии (освежители воздуха, дезодоранты и т.д.).

Диагностика эпизодического употребления весьма сложна, так как изменения поведения наслаиваются на проявления подросткового периода.

Выявить, что ребенок вдыхает пары газов (не в момент опьянения, а чуть позже) очень сложно, так как не остается запаха и действие газа проходит очень быстро.



На вовлечение подростка в употребление токсических веществ могут указывать СЛЕДУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ:

- вначале, после употребления, поведение может напоминать поведение при алкогольном опьянении (дурашливость, приподнятое настроение, шаткая походка);
- при нарастании степени опьянения характерно изменение поведения (поведение непредсказуемо, зависит от характера галлюцинаций);
- нарушение ориентировки в месте и времени, потеря самоконтроля в состоянии опьянения;
- отечность лица;
- покраснение и раздражение области рта, носа, слизистых верхних дыхательных путей;
- осиплость голоса, кашель;
- слабость, головная боль, тошнота и рвота;
- потеря прежних интересов;
- нарушение высших психических функций (память, внимание, интеллект);
- расстройства поведения: прогулы, обман, скрытность и др.;
- эмоциональные проявления: агрессия, раздражительность и т.п.;
- обнаружение в личных вещах баллончиков, зажигалок, бутылок и т.п.

Контролировать количество вдыхаемого газа ПРАКТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО!
Всегда присутствует риск отравления!

ПРИЗНАКИ ОТРАВЛЕНИЯ ПАРАМИ ГАЗОВ

- ❗ выраженная головная боль, головокружение;
- ❗ чувство перебоев в работе сердца (аритмия), учащение пульса больше 100 ударов в минуту;
- ❗ одышка;
- ❗ рвота, сильные боли в животе;
- ❗ нарастание отеков, появление множественной аллергической сыпи;
- ❗ различные степени расстройства сознания – ребенок заторможен, вяло и односложно отвечает на вопросы, плохо ориентируется в происходящем, засыпает, в тяжелых случаях сознание полностью отсутствует;
- ❗ возможно развитие психозов, характеризующихся нарушением ориентировки в пространстве, неадекватным поведением;
- ❗ судороги.

Нередки случаи летального исхода вследствие удушья, токсического угнетения центров дыхания и кровообращения.